



Monophasic Hyaluronic Acid
BELLCONTOUR® GVISC
GENEVA

*No limit
to Perfection...*



ПРЕПАРАТ ДЛЯ ИНТИМНОЙ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ

Качество жизни человека – это категория, с помощью которой характеризуют существенные обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы. Качество сексуальной жизни - одно из важных составляющих этого понятия.

Расстройства сексуальной жизни женщины не только заставляют ее страдать морально и физически, но часто являются причиной несчастных браков, ведут к разводам. Известно, что число разводов за последние годы имеет тенденцию к росту. Сексуальные дисгармонии в семье являются одной из наиболее распространенных причин разводов. В свете этого, проблема лечения сексуальных расстройств у женщин приобрела социальное значение.

Психо-эмоциональный склад у женщины значительно сильнее зависит от чувственного восприятия мира, чем у мужчины. Это в большей степени относится к сексуальной жизни. Так, общеизвестно, что глубина сексуального переживания и наслаждения женщины в отличие от мужчины не столько зависит от непосредственного физического контакта, сколько от эмоционального настроя и от образного психологического переживания состояния близости. Эстетические недостатки в интимных зонах мешают полноценной, как сексуальной, так и личной жизни. Важно то, что нестандартное строение половых органов чревато заболеванием урогенитальной сферы. Вот почему с момента вхождения в практику, процедура коррекции формы и строения половых органов вызывает устойчивый интерес.

В последние годы заметно возросло желание женщин улучшить внешний вид и чувствительность интимной зоны, совершенство которой значит для многих ничуть не меньше, чем красота лица, волос и тела. По статистике самыми распространенными причинами обращения к специалистам по поводу проблем в генитальной области являются: ксероз клитора – 29% обращений; зияние, сухость преддверия влагалища – 17%; сухость, истончение мантии клитора – 15%; снижение чувствительности точки G – 13%.

**По статистическим данным
ООО «Профессорская клиника Юцковских»
в течение 2006-2011 годов.*



Интимный филлинг (аугментация) – это метод инъекционной контурной пластики аногенитальной области, позволяющий восполнять объем мягких тканей путем введения препаратов гиалуроновой кислоты интра- и субдермально

ИНТИМНЫЙ ФИЛЛИНГ У ЖЕНЩИН

Интимная пластика наружных половых органов – это одно из востребованных направлений в интимной хирургии, целью которой являются устранение эстетических и функциональных недостатков, связанных с возрастными изменениями или индивидуальными особенностями женской генитальной области, увеличения сексуальной привлекательности и психологического комфорта женщины.

Ранее специалисты, занимающиеся эстетической коррекцией аногенитальной области имели в арсенале только хирургические методы, иногда неоправданно дорогие и технически сложные в исполнении, но на сегодняшний день специалисты имеют возможность освоить и применять инъекционные методы интимной пластики.

На пути становления интимная контурная пластика для женщин и мужчин преодолела несколько этапов, связанных с видом применяемого инъекционного материала (филлера).

Наиболее современным методом интимной контурной пластики, проводимой в целях коррекции аногенитальной области, является введение геля гиалуроновой кислоты BELLCONTOUR® GVISC, созданного специально для этой области тела и использующегося в Европе с 2005 года. Основные критерии выбора препарата – максимальная эффективность и клинически доказанная безопасность.

ПОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:

- Деформация половых губ (посттравматические, постоперационные, послеродовые разрывы)
- Асимметрия половых губ
- Дефекты промежности (анатомические, посттравматические, послеродовые, врожденные)
- Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ (гипоплазия, аплазия)
- Сухость слизистой (ксероз)
- Крауэроз

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ:


- Снижение тонуса кожи
- Дряблость и провисание мягких тканей промежности, стенок влагалища вследствие возрастных инволюционных изменений
- Липодистрофия больших половых губ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ:

- Недостаточное достижение сексуального удовлетворения
- Психологический дискомфорт и сниженная самооценка
- Сниженное либидо



ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО ФИЛЛИНГА



- Лабиопластика - коррекция объема и формы больших и малых половых губ
- Перинеопластика - коррекция преддверия и стенок влагалища
- Клиторопластика - увеличение объема головки и кармана клитора
- Аугментация точки G
- Коррекция инволюционных изменений
- Косметический эффект – «омоложение»

Зона коррекции	Большие и малые половые губы	Преддверие влагалища	Стенки влагалища	Клитор	Точка G
Показания	<ul style="list-style-type: none"> • Деформации (посттравматические, послеоперационные, послеродовые разрывы) • Асимметрия • Дефекты промежности (анатомические, постоперационные, посттравматические, послеродовые, врожденные) • Зияние половой щели вследствие недостаточно выраженных половых губ (гипоплазия, аплазия) • Сухость слизистой (ксероз) • Снижение тонуса кожи, дряблость и провисание мягких тканей промежности, стекнок влагалища вследствие возрастных инволюционных изменений • Липодистрофия больших половых губ 	<ul style="list-style-type: none"> • Сухость слизистой (ксероз) • Крауэрз • Раздражения • Частые воспалительные процессы 	<ul style="list-style-type: none"> • Снижение тонуса стенок влагалища вследствие возрастных инволюционных изменений. • Сухость слизистой 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточная выраженность вследствие возрастной инволюции • Сниженная чувствительность. • Полностью скрыт под кожным лоскутом («капюшоном») 	<ul style="list-style-type: none"> • Аномалия формы влагалища • Недостаточное достижение сексуального удовлетворения • Психологический дискомфорт и сниженная самооценка • Сниженное либидо.
Способ коррекции	Аугментация в глубокие слои дермы или субдермально для увеличение объема, коррекции формы, восстановления симметрии больших и малых половых губ	Аугментация в область преддверия влагалища	Аугментация в подслизистый слой стенок влагалища	Увеличение объема головки и кармана клитора	Аугментация в проекции точки G: Перигенитально поверхношно в слизистую оболочку на глубину 3-5 мм
Ожидаемый эффект	Косметический эффект, восстановление барьерной функции, нормализация температурного режима	<ul style="list-style-type: none"> • Восстановление барьерной функции • Нормализация температурного режима • Увлажнение слизистой 	<ul style="list-style-type: none"> • Увлажнение слизистой • Уменьшение объема влагалища 	<ul style="list-style-type: none"> • Усиление чувствительности, увеличение объема • Увлажнение слизистой 	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение чувствительности при половом контакте • Уменьшение объема влагалища • Увлажнение слизистой • Коррекция недержания мочи • Улучшения качества жизни и самооценки.

КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА БОЛЬШИХ ПОЛОВЫХ ГУБ

Этот вид контурной пластики применяется при липодистрофии больших половых губ. В норме большие половые губы прикрывают малые, что способствует, прежде всего, уменьшению риска инфицирования влагалища и поддержанию температурного режима гениталий. Увеличение объема больших половых губ не только восстанавливает барьерную функцию и температурный режим, но также позволяет достичь внешнего эффекта омоложения.

КОРРЕКЦИЯ ОБЪЕМА МАЛЫХ ПОЛОВЫХ ГУБ

Восполнение объема малых половых губ, наряду с восстановлением барьерной и секреторной функции, значительно повышает эстетику малых половых губ, особенно при выраженной гипоплазии, асимметрии, родовых и послеоперационных разрывах и деформациях.

ПЛАСТИКА КЛИТОРА

Заключается в наполнении головки и кармана клитора гиалуроновой кислотой в целях увеличения объема и «усиления» чувствительности самого клитора, а также увлажнения и укрепления его «капюшона». Пластика проводится в случаях, когда клитор полностью покрыт кожным лоскутом – так называемым «капюшоном», что затрудняет достижение женщиной клиторического оргазма.


КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИНВОЛЮЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Беременность и увеличение массы тела могут вести к появлению жировых накоплений и ослаблению поверхностной фасциальной системы, что, в свою очередь, приводит к перинеальному птозу (опущению) тканей.

С возрастом перинеальный птоз прогрессирует, одновременно происходит потеря подкожного жира. Кожа больших половых губ истончается, становится атрофической. Малые половые губы, уменьшаются до 1,5 см и меньше. Клитор уменьшается в размерах, снижается его чувствительность.

Большие изменения претерпевают преддверие и стенки влагалища. Теряется тонус и упругость влагалища, особенно у многократно рожавших женщин. Уменьшается складчатость и эластичность стенок, они становятся гладкими, плотными, легко раздражимыми. С падением уровня эстрогенов, эпителий влагалища истончается, снижается способность выделять собственную смазку. Что часто приводит к развитию атрофического вагинита.

Участвуя в гидродинамике тканей, 1 молекула гиалуроновой кислоты может связывать и удерживать до 500 молекул воды.



АУГМЕНТАЦИЯ ТОЧКИ G

Аугментация (наполнение, увеличение) точки G – процедура, которая также проводится под местной анестезией. В подслизистый слой между стенкой влагалища и уретрой в проекции точки G вводится гель гиалуроновой кислоты BELLCONTOUR® GVISC. В результате происходит не только увеличение области точки G, но и некоторое уменьшение объема влагалища.

После инъекции геля, точка G становится более доступной для стимуляции, так как становится более выступающей частью передней стенки влагалища, это увеличивает ее чувствительность при половых контактах и способствует улучшению сексуальной удовлетворенности женщины.

Процедура особенно актуальна, когда область точки G труднодоступна для тактильного воздействия вследствие аномально изогнутой формы влагалища.

Введение геля в область точки G позволяет также уменьшить гиперподвижность уретры – основную причину недержания мочи, возникающую вследствие инволюционных изменений тканей.

Таким образом, данная процедура может решить сразу две серьезные проблемы.

ПОЧЕМУ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА?

Гиалуроновая кислота - гликозаминогликановый биополимер, являющийся незаменимым тканевым компонентом организма. Гиалуроновая кислота является главным компонентом межклеточного вещества, отвечающим за его вязкость. Она связывает воду и образует гидратированные полимеры высокой плотности, которые заполняют внутриклеточные пространства. С возрастом количество гиалуроновой кислоты в коже прогрессивно уменьшается, что приводит к процессам дегидратации и сморщивания.

Гиалуроновая кислота отвечает требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в интимной пластике, а именно:

- Нет антигенных свойств
- Не мигрирует
- Проста в применении
- Не токсична
- Не вызывает воспалений
- Биосовместима
- Апирогенна
- Стабильна
- Медленно абсорбируется

BELLCONTOUR® GVISC – ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ ИНТИМНОГО ФИЛЛИНГА

Представляем новый препарат из серии швейцарских филлеров последнего поколения - BELLCONTOUR® GVISC.




BELLCONTOUR® GVISC – ИНЬЕКЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (ФИЛЛЕР), ПОКАЗАН ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМА МЯГКИХ ТКАНЕЙ В АНОГЕНИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, КОРРЕКЦИИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ПОЛОВЫХ РАССТРОЙСТВ И УЛУЧШЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ.

С 2005 года в России зарегистрирован препарат BELLCONTOUR® GVISC, предназначенный специально для интимной пластики, как у мужчин, так и у женщин.

BELLCONTOUR® GVISC - это стерильный, апирогенный, изотоничный, вязко-эластичный, биодеградируемый гель, содержащий высокоочищенную гиалуроновую кислоту неживотного происхождения с заданной плотностью, стабилизированную молекулами BDDE (бутандиол диглицидил эфир), что обеспечивает ему наименьшую токсичность и минимизирует аллергические реакции.

В отличие от филлеров предыдущего поколения BELLCONTOUR® GVISC изготавливается по новейшей технологии CPM. Технология CPM (Cohesive Polydensified Matrix) позволяет получить трехмерный монофазный полиуплотненный гель с очень высоким качеством поперечного соединения цепей гиалуроновой кислоты, устойчивых к деформации и скручиванию. Это придает препарату уникальные свойства, которые позволяют создавать более естественный объем и максимально длительный эффект, учитывая индивидуальные особенности кожи и мягких тканей пациента.



BELLCONTOUR® GVISC показан для работы с интимными зонами, так как легко вводится, хорошо распределяется в тканях, эффективно компенсирует объем, обеспечивает продолжительный результат, не вызывая аллергических реакций.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ ШПРИЦА:

- Модифицированная заточка игл снижает травматичность, риск возникновения гематом
- Просвет иглы в 27G облегчает введение геля для специалиста
- Эргономика шприца и специально выполненный поршень-стержень обеспечивают исключительное удобство при захвате пальцами.
- Возможность использования канюль по специальным техникам введения.



BELLCONTOUR® GVISC

Концен-трация, мг/мл	Степень связки	Способность к увеличению объема	Игла	Показания	Область введения (слои дермы)	Форма выпуска	Примерный срок действия до коррекции*
24	++++	● ● ● ● ● Технология 3D-Матрикс	6X27G1/2	Увеличение объема мягких тканей в урогенитальной области.	Глубокие	3Х0,8 мл 3Х1,0 мл	В среднем 9-12 месяцев


ФОРМА ВЫПУСКА BELLCONTOUR GVISC

- 3 шприца 0,8 – 1,0 мл в одной коробке
- 1 мл BELLCONTOUR® GVISC содержит 24мг гиалуроновой кислоты.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Автоиммунные заболевания, беременность, грудное кормление, склонность к развитию гипертрофических рубцов, острые воспалительные процессы в местах предполагаемой инъекции, наличие перманентных филлеров.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ ВВЕДЕНИЯ BELLCONTOUR® GVISC:

- Простая и быстрая техника
- Процедура выполняется в амбулаторных условиях
- Под местной анестезией (анестезирующий крем, лидокаин-спрей)
- Высокая степень безопасности
- Быстрый видимый эффект
- После полного рассасывания препарата, инъекцию можно повторять столько раз, сколько необходимо, без какого-либо дополнительно риска.

ЦЕЛЬ:

Процедура интимного филинга дает возможность пациентке решить ряд важных медицинских и психологических проблем, что в конечном итоге лучшим образом отражается на качестве ее жизни.

ИССЛЕДОВАНИЯ:

Результаты проведенного исследования позволяют говорить об улучшении качества жизни у всех женщин, подвергшихся инъекционной лабиопластике с применением препарата гиалуроновой кислоты, 63% женщин заявили об улучшении сексуальной функции после процедуры.

Мазуркевич М.В., Шугушева Л.Х., Фирсова Т. А.,
Гвасалия Б.Р. Андрология и генитальная хирургия №2-2011. С. 98-99

*Всем женщинам было проведено анкетирование до и после проведения процедуры по международным опросникам женской сексуальной функции, качества жизни и состояния здоровья: FSFI (Female Sexual Function Index), IQoL (Incontinence Quality of Life Questionnaire), SF36 Health Survey (Short Form with 36 questions).

